

MONOGRAFIA DE LOS SCYDMAENIDAE DE CHILE

por

Gmo. B. CALVERT

Ex profesor del Liceo de Quillota

La familia Scymaenidae incluye coleópteros muy pequeños, hala-
dos por lo general debajo de la corteza de los árboles, o debajo de pie-
dras, entre musgos, hojas caídas, hormigueras o aún del agua.

Son pequeños, lustrosos, generalmente ovalados, pero a veces
son muy delgados; de un color moreno o aún negruscos y vestidos
con pelitos erguidos.

Son muy vecinos a los Pselaphidae, pero se distinguen a la pri-
mera vista en que los élitros cuñen enteramente el abdomen.

Las antenas nunca son laminadas, sino en forma de maza o con
una porra, y por esto también llevan el nombre de Clavicornios; a
veces también las antenas son monoliformes, esto es que parecen
una sarta de cuentas o mostacillas.

Pertenecen a los pentámeros, esto es a los Coleópteros que tie-
ne cinco articulaciones en todos los tarsos.

Los caracteres generales de la familia son los siguientes:

SCYMEMIDAE

La cabeza un poco angostada atrás; el torax algo globoso, más
ancho en la cabeza; los élitros amplios, convexos, enteros; las ante-
nas largas, en forma de maza o a veces termina en una porra; los

palpos con la tercera articulación grande, piriforme, y la última pequeña; las patas delgadas, los muslos engrosados; los tarsos pentámeros.

Primera Sección.— Antenas separadas en la base, colocados delante de los ojos, y debajo la frente en las orillas laterales, ordinariamente elevados, metido, el ápice no, además poco elevado. El último artículo de los palpos maxilares notablemente aguzado. Las coxas posteriores apenas separadas. El epistema y el metatorax oculto. El mesoterno por debajo, carinao. Los élitros en la base frecuentemente bisurcados.

Los ojos bastante grandes, en forma de granos. La frente bastante hundida, con dos hoyuelos atrás. El protórax casi cuadrado apenas redondeado en los lados, a los menos en la última parte del margen. La cabeza menos estrecha que el cuello.

Scymaenus

Las antenas se engruesan insensiblemente poco a poco hacia el ápice.

Los élitros con dos hoyuelos en la base, el ápice redondeado, el pigidio desnudo.

El prosterno corto, profundamente sinuado adelante.

El mesoterno en el medio y el metasterno adelante de un leonado lanoso.

Segunda sección.— Las antenas poco separadas en la base, frente hinchada, el ápice en forma de clavo, cabeza larga, detrás de los ojos frecuentemente pulido y pequeño, no elevado, en el cuello muy estrecho. El protórax sin crilla en los lados y una impresión profunda en la base. Las coxas posteriores bastante separadas. Los segmentos abdominales son 6 en la hembra y 7 en el macho.

El último artículo de los palpos maxilares no notable. Las antenas con la porratri-articulada, no peludo, los artículos 7 y 8 pequeños. El mesoterno ligeramente cariando. Las coxas posteriores bastante separadas. El episterno y el metasterno libre. El protórax, ya ovalado o ya globular. Los élitros redondeados en el ápice, el pigidio desnudo, menos corto, ápice con poco margen.

Eumicrus

Las antenas como quebradas, el 1er. artículo largo, el 2º vez y media más largo, el 5º mayor; 7º y 8º pequeños, transversos la po-

rra grande, el último artículo oblongo, ovalado, penúltimo no transverso y dos veces más largo.

El protorax casi ovalado, con dos hoyuelos en la base.

Los élitros con un hoyo ancho en la base y profundamente marcado.

Los tarsos posteriores con el 2º artículo un poco más largo que el 1º, los anteriores de la hembra medianos, los del macho fuertemente ensanchados.

El metasterno en ambos lados de un leonado lanoso.

A. El artículo 4º de los palpos maxilares cincelado.

Fémores posteriores simples.

1. Las antenas con los últimos 4 artículos separados y comúnmente muy grandes.

A. Torax coniforme.

b. Torax angosto atrás.

2. Las antenas con los últimos 5 artículos separados, o bien mayor.

3. Las antenas con el 7º artículo muy grande.

B. Palpos maxilares en el 3º y 4º artículo fusiformes.

Eumicrus

1. Las antenas en los 3 últimos artículos mayores.

Torax más o menos cordato.

a. Cuerpo ovalado.

Antenas de un rojo ladrillo oscuro, peludas, gruesas, apenas más largas que la cabeza, y el torax.

El 1er. artículo alargado, 2º más largo que ancho y angosto en la base, el 3º al 7º, más o menos gruesos y cuadrados, los últimos cuatro más grandes, 8º y 10 casi globulosos, más anchos que largos, el último mayor y puntiagudo.

La cabeza triangular, truncada atrás, los ángulos redondeados, ligeramente impresa entre las antenas, muy peluda, lustrosa.

El torax más largo que ancho, truncado anteriormente, anchamente redondeado en la base, ángulos posteriores obtusos, casi convexo, muy peludo.

Los élitros ovalados y alargados, planos en el disco, levemente punteados (casi lustrosos) con regularidad, la doblez del hombro poco elevado.

Cuerpo por debajo poco lustroso y muy velludo.

Las patas rojizas, los fémures poco en forma de clavo.

Absconditus, Schaf

Del tamaño de *H. elwiegii*; más largo y se distingue por los élitros menos convexos que el tórax.

De un ferruginio rojo, los palpos, tibias y tarsos pálidos.

El 1er. artículo de las antenas cilíndrico, el 2º tan largo como el 1º y angosto en la base, el tercero más largo que ancho, 4º a 6º, casi moniliformes, el 7º grueso los 4 últimos muy claramente mayores, casi globosos y el último apenas puntiagudo.

La cabeza por detrás, semi circular, truncada adelante, lustrosa; poco peluda; ojos poco salientes, pequeños y rojizos.

El torax alargado, bastante redondeado antes del centro, angosto, lustroso adelante; pero peludo, los ángulos posteriores obtusos y brevemente ahuecado.

Los élitros elípticos y alargados, poco convexos, lustrosos, con unos pelitos esparcidos, angostos en la base, hundidos, la sutura elevada cerca del escudo.

Latitarsus

Las antenas tan largas como la cabeza y torax, de un color fábrillo rojizo, peludas; los artículos 1º y 2º de igual largo, el 1º grueso, 5 a 7 casi cilíndricos, insensiblemente más largos, los 4 últimos claramente mayores, muy separados; el 8º más largo que ancho; 9 y 10 casi globulosos; el último alargado.

La cabeza triangular, cerca de los ojos, estrechados, el vértice redondeado, muy peluda y velluda, poco convexa, de un castaño rojo oscuro, levemente ahuecada entre las antenas; los ojos salientes.

El tórax largo y estrecho, redondo y angosto antes del medio un poco redondeado, atrás apenas sinuado, los ángulos rectos, convexo, lustroso, velludo, de un castaño rojo obscuro, una línea transversal en la base poco marcada, un hoyuelo en cada lado delante del escudo.

Los élitros ovalados, de un castaño rojo, lustroso, muy pubescentes; la doblez humeral en forma de clavo, la base marcada con dos puntos.

El cuerpo por debajo de un castaño rojo, esparcidamente veludo.

Las patas de un ladrillo rojizo, los muslos en forma de cuñ, tarsos y palpos leonados.

Longiceps

Las antenas tan largas como la cabeza y tórax de un leonado rojizo, peludos, los artículos 3—6 más o menos iguales, los 5 últimos mayores; 7 y 10 casi globosos, el último cónico.

La cabeza negruzca, peluda, oblonga, casi convexa; ojos salientes.

El tórax adelgazado adelante, casi alargados, ensanchado, truncado en la base, de un rojo castaño, esparcidamente; peludo, con dos puntos en cada lado antes de la base y marcado con una línea transversa, y con dos puntos después de la linea.

Los élitros anchamente elípticos, peludos, los pliegos humerales casi levantados.

El cuerpo por debajo de un rojo castaño.

Las patas de un leonado rojo, los muslos casi en forma de clavo o cuñ.

Nodicornis, Schauf.

Las antenas gruesas, tan largas como la cabeza y tórax, con pelos densos, blancos; artículos 1º y 2º largos, 3º y 4º ovalados; 5 y 7 un poco gruesos; 5—6 casi globosos; el 7º mayor, casi cuadrado, los cuatro últimos separados; 8 y 10 casi transversos, el último estrechado longitudinalmente, casi puntiagudo.

La cabeza casi redonda, truncada atrás, convexa, con pelos densos y amarillos, lustrosa; los ojos poco salientes.

El tórax alargado, un poco sinuado en la parte posterior, redondeado adelante y truncado; y en la base profundamente bipunteado y con una carina antes del escudo, los ángulos posteriores marcados longitudinalmente, agudos densamente.

Los élitros elípticos, alargados, casi hundidos densamente punteados y profundamente marcados en la base, los pliegues humerales levantados y alargados.

Las patas lelgadas, los muslos en forma de cuñ.

Enteramente ferrugineo.

Eumicrus, Cast.

El ápice de las mandíbulas agudas, bidentado en el interior de la base.

El 3º y 4º artículo de los palpos maxilares fusiformes.

El 2º artículo de los palpos labiales muy largo.

Los tres últimos artículos de las antenas, más grandes. Tórax más o menos cordato.

Cuerpo ovalado.

Flaviolus, Schaf.

Las antenas más largas que la cabeza y tórax. Artículo 1º alargado, grueso adelante; 2 y 4 más o menos iguales; 5º prolongado. 6º casi cuadrado; 7 y 8 brevemente dilatados exteriormente, los 3 últimos más grandes; el 9º ovalado; 10º casi cuadrado, el último ovalado adelante.

La cabeza casi cuadrada redondeada atrás, apenas angosta; los ojos apenas salientes.

El tórax brevemente ovalado, muy ancho antes del centro, muy convexo, finamente punteado; los puntos con pelos; la base ligeramente redondeada con 4 hoyuelos.

Los élitros ovalados adelante, truncados en la base, poco marcados; el pliegue humeral poco levantado; lustroso, muy finamente punteado y con vello amarillo.

Las patas de un leonado amarillo, los muslos como cuño.

Familia SCYMAENIDAE

Primera Sección.—Antennae basi distantes, ante ocultos Subfrontis margenes laterali; plerumque elevato, insertae, apice hand, vel parum elevatae; palpi maxillares, articulo ultimo aciculari conspicuo. Coxae posticae vix distantes. Episterna metathoracis occulta. Mesosternum subilius carinatum. Elytra basi salpissima bisulcata.

Oculi sat magni granulati, Frons depressescula, postici bifoveolata. Prothorax subquadratus, lateribus vix rotundatis, saltem ultra medium marginatis. Caput collo minus constricto.

Scymaenus, Latreille.

Antennae apicem versus sensim paulo incessati.

Elytra basi bifovealata, apice rotundatus, pygidia summo apice nudo.

Prosternum breve, antice profundius sineratum.

Mesosternum medio et metasternum antice pulvo carata.

Segunda Sección. — Antenae basi parum distantes, fronti pretuberanti insertae, apice elevati. Caput longe pone oculos saepissime, caeves et parvos, haud prominulos, in cellum valde constrictum. Prothorax lateribus inmarginatus, impressione profundi basali. Coxae posticae sat distantes. Abdomen segmentis 6 feminac. maus y compositum.

Palpi maxilares articula ultimo haud conspicuo, antenae clava tribus articulatu, haud pilosa, artículo 7 y 8 parvis. Mesostersum levites carinatum. Coxac posticae late distantes. Episterna metathorax libera. Prothorax ovatus vel subglobosus. Elytra apice rotunda ta, pygidio nuda. Prosternum minus breve, apice parum marginate.

Eumicrus, Laponte.

Antenae subrefractus, artículo 1º oblongo, 2º sesqué longiore; 5º contiguis majore; 7º et 8º minimis transversis, clava magna artículo último oblongo ovate, penúltimo haud transverso, duplo longiore.

Prothorax subovatus, basi 4 foveolatus.

Elytra base foveo latiuscula basali profunde impressa.

Tarsi postice articulo 1º, 2º parum longiore, antici feminae modece, maris fortius dilatati.

Mesosternum lateribus utrinque fulvo lanatum.

A. Palpi maxilares articule 4º subulati, Genera Scymaenus.

Femora postica simplicia.

1. Antennarum articulis quartuor ultimis distincta plerisque abrupte majoribus.

a. Thorax coniformis.

campestris.

b. Thorax postice angustatus, absconditus, *latitarsus*.

2. Antennarum articulis quinque ultimus distante vel abrupte majoribus.

longiceps.

3. Antennarum articulo séptimo máximo, *nudicornis*.
B. Palpi maxilares articule tertio quartoque piriforme.

Género *Eumicrus*.

1. Antennarum articulis tribus ultimis majoribus. Thorax plus minusve subcordatus.

Corpus obovatum.

Flaveolus.

Antennarum articulis quartior ultimis distinete, plerumque abrupte majoribus.

Thorax coniformis.

Scymaenus campstris. — Schauf, Monog Scyn, pág. 47, n. 13, 1866.

Obovatus deplanatus pisens antennis, palpis pedibusque testaceis, subnitidus, subtus pubescens, supra pilosus; capite triangulati int̄ antennae impresso; throveace breviter conico elytris elongato, ovatis, sublilita punctulatis.

Long. 1 1|2, 1 3|5 mm.; lat 2|5 5|8 mm.

Var. a. Elytris rufo-testaceus.

b. Lotus testaceus (unmaturus).

Antennae obscure rufo testacea, pilosae, crassissimae, capite, thorace que vix longiores; articulo primo elongato, secundo latitudine longiore ad basin angustate; 3 y 7 sensim crassiaribus, subquadratis, quartuae ultimis abrupte.

Majoribus, 8 y 10 subglobosis, longitudine lateribus ultimo maximo acuminato.

Caput triangulare; postice truncatum, angulis rotundatis, inter antenas laviter impressum; dense pilosum nitidum.

Ihorax latitudine longiore, antice truncatus, basi late rotundatus, angulis posticis obtusis; subconvexas, dense adpresso pilosus, subnitidus.

Elytre elongato, ovata, disco planata; subtiliter punctulata, regulariter adspersa pilosa; plica humereti parum elevata.

Corpus subtus parum nitidum dense pubescens.

Pedes testacei, femoribus parum clavatis.

Esta especie he hallado en Quillota, entre la basura que se junta en las raíces de los cactitas, etc. Mes de Abril.

Ihorax posici angustatus.

Scymaenu absconditus. — Sch., Encroy, pág. 61, n. 30, 1866.

Elongatus, rufo-ferruginanus, nitidus, farrum pilosus, capite postice rotundate; thorace elongato, utrinque rotundato, postice foveato; elytris elongato, elliptico.

Long 1 3|5 mm.; lat 3|5 mm.

Statura que Sc Helwigi, sed elongatior, thorace elytrisque minus convexis ete difert.

Rufo ferrugineos, palpis tibis, tarsisque pallidis.

Antennae articulo primo robuste, cylindracio, secundo primo longitudine aequali ad basin angustato, tertio latitudine longiore, 4-6 submonili formibuis, septimo crasuosculo, quartier ultimis distincte abrupte majoribus subglobosis, ultimo vix acuminatae.

Caput postice semicirculare, antice truncatum; nitidum, sparsim pilosum; oculis purum prominatis, minutis testaceis.

Ihorax elongatus, ante medium utrinque rotundatus, antici angustatus, nitidus, supraeum pilosus; angulis posticis obtusis leviter foveatis.

Elytra elongate, elliptica, parum convexa, nitida desperse punctato pilifera; basi angustato, impressa, sutura ad scutellum elevata.

Esta especie hallé en las Cordilleras de Penehue, en el mes de Enero, entre las raíces de Coligües.

Scym latitarsus. — Sch., Monog. pág. 61, n. 31, 1866.

Obvatus, rufo-castaneus, nitidus, hirsutus, capite subtriangulari; postici dense piloso; horace subelongato, nutroris angustato, postici utrinque parum sinuate, ante basin bi foveolatae; elytris ovatis, punctati piliferis; tarsis anticis, articulis tribus dilatatis.

Long 1 3|4 m. m.; lat 3|4 m. m.

Antennae capite thoraceque longiores, rufo-testaceas, pilosus, articulis 1-2 longitudine aequalibus, primo crasso; 3-7 subcylindraceis, sensim longioribus quartiae ultimo abrupte, majoribus, distanobres octo latitudine longiore; 9-10 subglobosis, ultimo elongato.

Caput triangulare, ad oculos latitudine breviore, vertice rotundatum, denseque pilosum, hirsutubem, parim convexum obscure rufo-castaneum inter antennas leviter impressum, oculis prominulis.

Ithorax longitudine angustice, ante medium, rotundato, angustatus, lateribus leviter rotundatis; postici utrinque vix sinuatus anguisque rectis; convexus, nitidus, hirsutus, obscure rufo-castaneus, basi linea transversa leviter impressa, ante scutellum utrinque foveolata.

Elytra ovata, rufo-castanea, nitida, dense pubescens, plica humerali clavata; base impressa bipunctata.

Corpus subtus rufo-castaneum, sparsim hirsutum.

Pedis, rufo-testacea, femoribus clavatis tarris, palpisque testaceis.

Quillota, debajo de piedras en los cerros y a la raíz de quiscos y tunas desde Abril hasta Octubre.

Antenarum articulis quinque ultimo distincte vel abrupte majoribus.

Scyn. longiceps. — Sch, Monog. pág. 67. n. 37, 1866.

Elongato obvatus, rufo-castaneus, nitidus, sparsim ochraceo; pilosus; capite oblongo, nigro piceus; su thorace subelongato; antrorsum angustate parum rotundatis; basi impressa utrinque bipunctata; elytris ellipticis, rubicundis, sparsim punctato piliferis.

Long, 2 m. m.; lat 2|8 m. m.

Antemas, capite, thoraceque longiores, rufo-testacea pilosa; articulis 3-6 subaequalibus, quinque, ultimus majoribus; 7-10 subglobosis, ultimo cónico; Caput primum, pilosum, oblongum; subconvexum; oculis prominatis.

Ithorax antrorsum attenuatus, sublongatus, lateribus; base trunneatus, rufo-castaneus, sparsim pilosus, ante basini utriusque bipunctatus, et lenia transversa impressus, postlineam utriusque bipunctatus.

Elytra late elliptica, subconvexa, basi horace latione utrinque impressa; laevis, sparsim punctato pilifera; plica humerali subelevata.

Corpus subtus rufo-castaneum.

Pedes, rufo-testaci, femoribus subclavatis.

Antennarum articule septimo maximo.

Scyn. nodicornis. — Sch, Mónoy, pág. 70, n. 40 1866:

Elongatus; subdepressus, ferrugineus, nitidus, dense depresso

pilosus; horace elongato, subcondato, base ante scutellum, profunde bipunctata; utrinque impresso, elvris elongato ellipticis, subdespresso, punctatio adpressa pilosis; antennarum articulo septimo crasso, subquadrati.

Long 2 m. m.; lat 3 1/4 m. m.

Antennas crassiusculae, capite, thoraceque longitudine aequales, dense albido pilosae; articulis 1-2 elongatis; 3-4 oovalibus; 5-7 sensim crassibus; 5-6 subglobosis; septimo maximo, subquadrate, quartuor ultimis abrupte; 8-10 subtransversis, ultimo longitudine angustiore subcuminato.

Caput, subrotundatum, postice truncatum, convexum; dense ochraceo pilosum, nitidulum; oculis parum prominulsi.

Ihorax elegatus, lateribus, postmedium sinuatis, anterius rotundatus; antice basique truncatus, antescutillum profunde bipunctatus et carinatus, angulis posticis longitudine alites impressu, aumates; dense adpresso pilosus.

Elytra elongato elliptica, subdepressa, dense adpresso pilosa, punctata; basi profunde impressa; plies humerali elevata, elongata.

Pedes graciles, femoribus subclavatis.

Iotus ferrugineus.

He hallado esta especie en Quillota en el mes de Octubre, entre hojas caídas de los árboles en las quebradas húmedas. La hembra se distingue del macho en que las antenas no tiene el 7º artículo más grueso, sino que las 5 últimas articulaciones son más o menos de igual tamaño.

Siempre se halla en compañía de *Formica nigriventris*.

Eumicrus, Lup.

Mandibulae parte apicali acutae, istus base bidendae.

Palpi maxillares articulo tertio, quartoque fusiformes.

Palpi labiales articulo secundo longissimo.

Antennarum articulis tribus ultimis majoribus. Ihorax plus minusve subcordatus.

Corpus obvatum.

Eumicrus flaveolus.— Sch, Monoy, pág. 84, n. 55 1866.

Obovatus rufo-cestaceus, nitidus, dense pubescens; thorace quadrifoveolato, elytrisque punctutato piliferis pilis brevibus.

Long 1 1/2 m. m.; lat 2/3 m. m.

Antennae, capite thoraceque longiores, articulo primo elongati; antice crassisculo, 2-4 subaequalibus, quinto longo; sexto subquadrato; 7-8 minutis extos dilatatis, tribus ultimo majoribus, mono ovali, decimo subquadrato; ultimo obovato.

Caput subquadratum, postici utrinque rotundato vix angustatum, oculis vix promnuatis.

Ihorax breviter ovalis, ante medium lertissimus, valde convexas, sublilissime punctulatus, punctis piliferis, basi leviter rotundatus, quadrifoveolatus.

Elytra obovata, basi truncatu leviter impressa, plica humerali leviter elevata; nitida, sublilissime punctulata, ocraceo pubescentia tia.

Pedes flavo testacei, femoribus clavatis.

Este lo hallé en Pemehue, Cordillera de Pichibutrau, entre las hojas al pie de los coligües y quilas en el mes de Enero.

Plymouth, Inglaterra, Marzo 1933.