

QUELQUES ICHNEUMONIDAE NOUVEAUX

RECUEILLIS PAR M. LE PROF. PORTER DANS LES PROVINCES
D'ACONCAGUA ET TACNA

PAR

JEAN BRÈTHES

Entomologiste au Musée National (B. Aires)

Archoprotus BRÈTHES, n. gen.

Mandibulae bi-dentatae, oculis interne parallelis, thorace subcylindrico, pronoto mesonoto humiliore, mesonoto lineis parapsidalibus sat notalis, segmento mediario parte supera cum parte postica arcuatim congruente, exareolato, spiraculis minutis, rotundatis, abdomine capite thoraceque conjunctim paulum longiore, basin versus modice depresso apice vix compresso, segmento 1.^o apicem versus gradatim dilatato, latitudine apicis quam longitudinem, paulum minore spiraculis paulum ante medium sitis, segmento 2.^o vix quadrato, apicem versus sensim dilatato, terebra abdomine brevior, alis normalibus, cellulis basalibus aequalongis, areola pentagonali, vena disco-cubitali in medio ramulo fracto emittente, alis posticis vena medio-basali pone medium angulata, tibiis 4 posticis bi-calcaratis, unguibus inermibus.

Typus: *A. Porteri*, n. sp.

Archoprotus Porteri BRÈTHES, n. sp.

♀ *Ferrugineus*, capite (mandibulis palpisque exceptis), basi abdominis et valvis terebrae nigris; palpis, tegulis, coxis et trochanteribus 4 anticis, ex parte, femoribus intus subtusque, tibiis 4 anticis intus extusque, segmentis 2-6 abdominis apice albidoflavis, alis hyalinis, venis obscure ferrugineis, stigmatibus ochraceo. Long. 7 mm. Alae: 5,5 mm. Terebra: 1,5 mm.

Le clypéus paraît nul, confondu qu'il est avec la face; celle-ci avec une légère proéminence au milieu qui n'est pas une corne, les joues moins lar-

ges que les yeux, tout le pourtour postérieur de la tête marginé. Le thorax est uniformément opaque, avec une punctuation très fine et serrée. L'abdomen est très légèrement chagriné devenant un peu plus lisse graduellement vers l'extrémité. Le 8.^e segment est un peu concave au milieu du dos; cette concavité est plus prononcée vers la base du segment.

1 ♀ de *La Ligua* (Aconcagua) 1909. (CÁRLOS E. PORTER, leg.)

Hyposoter Porteri BRÉTHES, n. sp.

♀ *Niger, abdomine ferrugineo, segmentis 2 primis disco piceo, mandibulis, palpis, (scafo subtus), squamis et basi alarum, coxis et trochanteribus 4 anticis, coxis posticis et trochanteribus totis flavis, pedibus testaceis, tibiis et tarsis 4 anticis luteolis, pedibus posticis fuscioribus, alis hyalinis, iridiscensibus. Long.: 8 mm. Alae: 4 mm. Terebra: 4 mm.*

La tête et le corselet sont uniformément ponctués et par là assez opaques, un espace lisse aux mésopleures sous les ailes avec stries à sa partie antérieure, le premier segment de l'abdomen paraissant impoctué à la partie antérieure, les suivants opaques devenant lisses vers l'extrémité de l'abdomen. Le thorax et le 2.^e segment de l'abdomen avec une pubescence très couette et grisâtre.

Le clypéus est légèrement convexe, arqué en avant, séparé de la face par une légère impression qui se relève au milieu vers la base des antennes; les yeux à bord interne parallèle, les ocelles postérieures plus éloignés entre eux qu'avec les yeux, le mésonotum à lignes parapsidales indistinctes, les propleures striées, le segment médiaire à aires antéro-médiane et postéro-médiane non séparées, la dernière striée en travers; aire latéro-basale pentagonale suivie d'une aire plus ou moins triangulaire. Le premier segment de l'abdomen est cylindroïde, aussi long que les fémurs moyens, légèrement dilaté vers l'extrémité, les stigmates placés après le milieu. Le 2.^e segment est un peu plus court que le 1.^{er}, assez comprimé; les segments suivants bien comprimés. Ailes entérieures à cellules basales également longues, aréole pédonculée, petite, la 2 récurrent terminant sous le milieu de l'aréole; ailes postérieures à veine médio-basale droite, sans veine qui sorte d'elle.

5 ♀ de *Valle Azapa* (Tacna) et *La Ligua*. (CÁRLOS E. PORTER, leg.)

Hyposoter similis BRÉTHES, n. sp.

♀ Cum precedente similis, sed scapo nigro, pedibus omnibus testaceo-ferrugineis.

Long. 7 mm. Alae: 4 mm. Terebra: 2,5 mm.

Très voisin du précédent dont il diffère par le scape noir comme le reste des antennes et les pieds uniformément d'une testacé ferrugineux; les propleures ne sont pas striées, non plus que l'espace lisse sous les ailes aux mésopleures; l'aire médiane du segment médiaire n'est pas non plus striée en travers; tout le segment médiaire a une ponctuation plus fine et moins distincte que chez *H. Porteri*. Le premier segment de l'abdomen a un canalicule latéral qui passe sous le stigmate en s'élargissant un peu vers l'arrière.

1 ♀ de Valle Azapa, Prov. de Tacna. (CÁRLOS E. PORTER, leg.)

♂. Le ♂ est semblable à la femelle, mai ses fémurs et ses tibias postérieurs sont presque noirs (les pattes antérieures manquent à l'unique ♂ dont je dispose. —De *La Ligua*. CÁRLOS E. PORTER, leg.)

BUENOS AIRES, le 20 Juillet 1913.

