

PROTOCOLO ANTROPOLOGICO DEL CRANEO DE "CHIU CHIU". (Fig. 24, a y b)

FIDEL JELDES A.
Instituto de Criminología

NORMA DE BLUMENBACH.

El diámetro transversal corta al sagital en su tercio medio, lo que da una figura ovoídea-elipsoídea con una fenozigia mediana.

Diámetro ántero-posterior: 17,6

Diámetro transverso: 13,9.

Índice: 78,9 MESOCEFALICO DE ANCHURA..

Eminencias frontales medianamente marcadas. Eminencias parietales medianamente marcadas. Líneas temporales marcadas. Sutura coronal simple en sus porciones bregmática y ptérica: en ambas porciones medias es complicada; no hay obliteración.

NORMA DE OWEN.

Anchura condilar: 1,3

Longitudinal condilar: 26

Índice de Baudoin: 50,0 SIGNO FEMENINO.

Anchura externa del maxilar superior: 58

Longitud del mismo: 51

Índice: 113,7 MESOURANO.

Anchura palatina: 3,3

Longitud palatina: 42

Índice: 78,5 ESTENOESTAFILINO.

Coanas ósea pequeñas. Apófisis pterigoides pequeñas. Fosas pterigoideas profundas. Fosa glenoídea más marcada en profundidad a la izquierda que a la derecha. Condilos occipitales curvos. Fosa condílea derecha muy profunda. Borde anterior del occipital liso. Suturas palatinas sagital y transversa sin anomalías y ligeramente obliteradas. Dentadura incompleta, la mayor parte de las piezas dentarias han caído antes de la muerte, pues hay reabsorción alveolar; lo mismo se puede decir de la mandíbula. Línea curva occipital superior medianamente marcada.

NORMA DE PRICHARD.

Anchura mínima del frontal: 9,1

Índice: 65,4 ESTENOMETOPICO.

Anchura piriforme: 2,5

Altura piriforme: 4,7

Índice: 54,3 EURIRRINO.

Altura facial superior: 6,2
 Diámetro bi-zigomático: 12,7
 Índice: 48,8 EURIENO.
 Anchura orbitaria: 3,5
 Altura orbitaria: 4,5
 Índice: 77,8 MESOCONQUIO.

No hay metopismo. Huesos nasales anchos pero pequeños en tamaño. Espina nasal anterior poco marcada. Relieve óseo alveolar inferior poco desarrollo.

NORMA DE LAURILLARD.

Anchura astérica: 10,7
 Índice: 76,2 MESOINIACO.

Hueso occipital sobresaliente. Protuberancia occipital externa medianamente marcada. Notamos en la región del lambda la ausencia de obliteración. Contorno ligeramente abombado.

NORMA DE CAMPER.

Altura craneal: 13,1
 Índice: 74,4 ORTOCRANEO.
 Índice: 94,2 METRICRANEO.
 Diámetro basio-alveolar: 9,2
 Diámetro basio-nasio: 10,7
 Índice: 90,5 ORTOGNATO.

Pterio en forma de H. Escama del temporal ligeramente abombada y baja. Sutura temporo-parietal simple. Sutura eseno-escamosa simple. Sutura ptero-frontal simple. No hay obliteración en ninguna de estas suturas. Apófisis mastoides pequeñas. Surco de **Silvio** externo marcado.

En un cráneo cuya edad probable se estima ubicada en el septenario de la madurez decreciente (42-56) dado al estado de reabsorción de las cavidades alveolares tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. Pertenece al sexo femenino, lo que podemos establecer directamente por las informaciones dadas por la Dra. Grete Mostny, quien dice que es probable que fuera la mujer del cacique del lugar; además los signos de las matoides y de los condilos también son positivos, señalando este cráneo como femenino. Presenta un contorno superior ovoídeo-elipsoídeo, con un módulo de 449 correspondiente a una capacidad craneal relativa de 1.380 c. c. Bóveda craneal medianamente elevada. Frente más bien estrecha. Nariz baja y ancha. Cara superior ancha. Orbitas medianamente anchas y bajas. Contorno posterior ligeramente abombado. Anchura posterior mediana. Paladar medianamente ancho. El perfil nasal superior es ortognato..

No hay deformación craneal de ningún tipo.

APENDICE:

Los cuerpos vertebrales: atlas y axis se presentan normales.