

AVES DEL VALLE DE COPIAPO, DE MAR A CORDILLERA, Y LUGARES ADYACENTES

Por ENRIQUE ERNESTO GIGOUX

Jefe de la Sección Zoológica.

—Gallina ciega. *Systellura longirostris* (Gould.). Especie poco común, residente.

—Picaflor grande. *Patagonas gigas gigas* (Vieillot.). Suele llegar a fines del invierno y permanece durante la primavera. A veces anida.

—Picaflor de la cordillera. *Oreotrochilus leuco pleurus* (Gould.). Se le ve en invierno y primavera. Cuando un invierno es benigno, no baja al valle.

—Picaflor común. *Sephancides sephanoides* (Lesson y Garnot.). Es residente y anida.

—Picaflor del norte. *Rhodopis vesper atacamensis* (Leybold.). Es un visitante de invierno, que llega hasta la costa.

—Tapacola. Tococo. *Scelorchilus albicollis atacamae* (Hellmayr.). No es muy común, es residente. Lo he visto en la quebrada del León, en Caldera.

—Canastero. *Asthenes humicula humicula* (Kittlitz.). No es común. Se le ve en las pequeñas quebradas con vegetación, de las faldas de los cerros y junto al mar.

—Tijerita. *Leptasthenura aegithaloides grisescens* (Hellmayr.). Es común y residente.

—Changa. Molinero grande. *Cinclodes nigro-fumosus nigro-fumosus* (Lafr. y D'Orbig.). Común por parejas a orillas del mar.

—Changita. Molinero chico. *Cinclodes oustaleti oustaleti* (Scott.). Vive lo mismo que la especie anterior y se encuentra en los mismos lugares.

—Pachurrón. *Ulpucerthia dumetaria hallinani* (Chapman). Esta especie llamada vulgarmente "Bandurrilla" en el centro y sur del país, no es común. Se le ve generalmente sola corriendo junto a las tapias de los potreros, y de los matorrales. Es residente.

—Pachurra. *Geositta cunicularia fissirostris* (Kittlitz.). No es muy común, y como todas las especies del género. se reúnen por parejas o pequeñas bandadas.

—Pachurra. Caminero, nombre que también se le da a la especie anterior. *Geositta cunicularia deserticolor* (Hellmayr.). No es ni muy común, ni abundante.

—Pachurra. *Geositta isabellina* (Philippi y Landbeck.). Es un visitante ocasional.

—Pachurrita. *Geositta marisima* (Lafres. y D'Orbig.). Es más común al interior que en la costa. Es escasa.

—Pachurra. Agachadera. *Geositta rufipennis fasciata*. (Philippi y Landbeck.). No es abundante.

—Gaucho. *Agriornis lívida lívida* (Kittlitz.). Se le ve siempre solo o por parejas.

—Gaucho. *Agriornis montana marítima* (Lafres. y D'Orbig.). Como la especie anterior.

—Diucón. *Xolmis pyrope* (Kittlitz.). Escaso. Se le ve siempre solo.

—Dormilón. *Muscisaxicola rufivertex rufivertex* (Lafres. y D'Orbig.). Llega en otoño y desaparece en primavera.

—Frailecito. *Muscisaxicola flanimucha* (Lafres.). Durante el año se ven pequeñas colonias residentes.

—Dormilón. *Muscisaxicola capistrata* (Burmeister). Llega algunos años en invierno.

—Dormilón. *Muscisaxicola frontalis* (Burmeister). Suele verse durante algunos inviernos.

—Dormilona cenicienta. *Muscisaxicola alpina cinera* (Philippi y Landbeck.). Llega algunos años en invierno.

—Dormilón de pico manchado. *Muscisaxicola maculirostris maculirostris* (Lafres. y D'Orbig.). Es visitante de invierno y llega a la costa.

—Tontito. *Muscisaxicola macloviana mentalis* (Lafres. y D'Orbig.). En Caldera he visto durante muchos años una pequeña colonia en forma residente.

—Colegial. *Lessonia rufa rufa* (Gmelin). No es común. Solo y por parejas lo he visto hasta en la orilla del mar.

—Torito. *Spizitornis parulus parulus* (Kittlitz.). Es residente y no muy común, solo o por parejas.

—Siete colores. *Tachuris rubrigastra rubrigastra* (Vieillot.). En las vegas y totorales. Es residente.

—Silbador. *Elaenia albiceps chilensis* (Hellmayr.). Llega a principio de la primavera, anida y se ve al terminar el verano.

—Golondrina negra. *Pygochelidon patagonica patagonica* (Lafres. y D'Orbig.). No es muy común.

—Golondrina bermeja. *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaer.). Visitante de invierno.

—Golondrina. *Iridoprocne leucopyga* (Meyen). Permanece mucho tiempo y anida.

—Zorzal. *Turdus falcklandii magellanicus* (King). Suele verse en invierno y llega hasta la costa.

—Tenca. *Mimus thenca* (Molina). Es escasa.

—Chircán. *Troglodytes musculus chilensis* (Lesson.). Es raro. Suele verse, a veces, en algunos inviernos.

—Chircán. *Troglodytes musculus atacamensis* (Hellmayr.). Es común, residente y anida.

—Caminante. *Anthus corredera chilensis* (Lesson.). No es muy común.

—Loica. *Pezites militaris militaris* (Lin.). No es abundante. Residente.

—Til o Tile. *Agelaius thilius thilius* (Molina). Común y residente.

—Jilguero común. *Spinus barbatus* (Molina). No es ni común ni abundante en ninguna época.

—Jilguero de la Cordillera. *Spinus uro pygialis* (Schlatter). Visitante de invierno y llega hasta la costa en pequeñas bandadas.

—Chirigüe. *Sicalis luteola luteiventris* (Meyen). Llega en invierno en grandes bandadas.

—Chipipe. Chirigüe cordillerano. *Sicalis olivascens chloris* Tschudi. Llega por pequeñas bandadas en invierno.

—Chingol. *Zonotrichia capensis chilensis* (Meyen). Común y residente.

—Diuca. *Diuca diuca crassirostris*. Abundante y residente.

—Gorrión. *Passer domesticus domesticus* (Lin.). Común y residente desde el año 1919.

—Yal. *Phrygilus fruticesi fruticeti* (Kittlitz.). Abundante y residente en los llanos y faldeos con vegetación.

—Yal chico. Platero. *Phrygilus alaudinus alaudinus* (Kittlitz.). No es muy común. Llega hasta la costa siempre por parejas.

- Cometocino. *Phrygilus gayi gayi* (Gervais). Llega en invierno en pequeñas bandadas, y permanece en primavera.
- Cometocino. *Phrygilus gayi atriceps* (Laftr. y D'Orbig.). Como la especie anterior.
- Tórtola común. *Zenaida auriculata auriculata* (Des Murs). Durante algunos inviernos suele llegar en inmensas bandadas.
- Tórtola cordillerana. *Metropelia melanoptera melanoptera* (Molina). Llega en invierno como la especie anterior. Se le suele llamar "Cuyuca".
- Tórtola cuyana. *Leptophaps aymara* (Knip. y Prévost). Llega también en invierno.
- Perdiz de la cordillera. *Attagis gayi gayi* (Lesson). No es abundante.
- El Cojón. *Thinocorus orbignyianus orbignyianus* (Lesson). No es común.
- Palquito. Perdicitá. *Thinocorus rumicivorus rumicivorus* (Eschscholtz). Común en primavera en los llanos con vegetación.
- Cóndor. *Vultur gryphus* (Lin.). Sin ser común, se le ve en todo el valle, hasta la costa.
- Gallinazo. *Coragyps atratus foltens* (Lichtenstein). Suele vérselo incidentalmente.
- Jote. *Cathartes aura jota* (Molina). Común y residente.
- Traro. *Polyborus plancus plancus* (Miller). Común.
- Tiuque de la cordillera. *Phalcooboenus megalopterus* (Meven). Común.
- Tiuque. *Milvago chimango chimango* (Viellot.). No es muy común.
- Vari. *Circus cinereus* (Viellot.). Es escaso.
- Aguilucho. *Buteo polyosoma polyosoma* (Quoy y Gaimard). No es muy común.
- Águila. *Geranoaetus melanoleucus australis* (Swann.). Visitante incidental.
- Peuco. *Buteo ventralis* (Gould.). No es muy común.
- Cernicalo. *Cerchneis sparveria cinamomina* (Swainson). Común y residente.
- Gavilán. *Falco peregrinus anatum* (Bonaparte). Incidentalmente se le suele ver en invierno.
- Halcón. *Falco fusco-coerulescens fusco-coerulescens* (Viellot.). No es común.

—Tucúquere. *Bubo virginianus nacurutu* (Vieillot). Es común, sin ser abundante.

—Nuco. *Asio flammeus brevauris* (Schelegel). Muy raro.

—Chuncho. *Glaucidium nanum* (Kin). Raro.

—Pequén. *Speotyto cunicularia cunicularia* (Molina). Común.

—Lechuza. *Tyto alba tuidara* (I. E. Gray). Común.

—Bandurria. *Theristicus caudatus melanopsis* (Gmelin). Común, en el valle y la costa.

—Flamenco. Parina. *Phoenicopterus ruber chilensis* (Molina). Común en la cordillera y salares, y en ocasiones llega a la costa.

—Flamenco. Parina. *Phoenicoparrus andinus* (Philippi). Lo mismo que el anterior.

—Garza grande. *Casmerodius albusegretta* (Gmelin). Más común en la costa que en el valle.

—Garza chica. *Egretta thula thula* (Molina). No es común.

—Huairavo. *Nycticorax nycticorax obscurus* (Bonaparte). Se le encuentra en la costa.

—Pilpilen negro. *Haematopus ater* (Vieillot, y Oudart). Común en la costa.

—Pilpilen overo. *Haematopus ostralegus pitanay* (Murphy). Habitante de la costa.

—Pollo del campo. *Oreopholus ruficollis* (Wagler). Común en primavera en los llanos con vegetación.

—Pollo de mar. *Squatarola squatarola cymosurae* (Thayer y Bangs). Visitante de las playas.

—Queltehue. *Belonopterus cayennensis occidentalis* (Harting). Llega incidentalmente.

—Pollo negro. *Zonibyx modestus* (Lichtenstein). Visitante de invierno.

—Pollo de mar. *Pluvialis dominicus* (Müller). Muy raras veces se le ve durante el invierno.

—Pollo de mar. *Charadrius semipalmatus* (Bonaparte). Suele vérselo en invierno.

—Pollollito. *Charadrius falklandicus* (Latham). Común en todo tiempo.

—Zarapito. *Numenius borealis* (Foster). Visitante de invierno.

—Perdicilla. *Numenius hudsonicus* (Latham). Común.

—Avecasina de mar. *Limosa haemastica* (Lin.). Muy rara. Se le ha visto algunas veces en invierno.

—Pitotoi chico. *Totanus flavipes* (Gmelin.). Llega en invierno.

—Pitotoi chico. *Totanus melanoleucus* (Gmelin.). Visitante de invierno.

—Pollo de mar. *Crocettia alba* (Pallas). Llega en invierno. Se le llama "Revuelve piedras".

—Pollo de mar. *Arenaria interpres morinella* (Lin.). Visitante de invierno.

—Pollo de mar. *Pisobia bairdii* (Cous). Visitante de invierno.

—Póllo de mar. *Pisobia fuscicollis* (Vieillot.). Visitante de invierno.

—Pollito negro. *Pisobia melanotos* (Vieillot.). Visitante de invierno.

—Porotero. *Capella paraguaiae magellanica* (Kin.). En invierno es común en el valle y en la costa.

—Phegornis mitchellii (Fraser.) Visitante de invierno.

—Avecasina pintada. *Nycticryphes semi-collaris* (Vieillot.). Llega durante algunos inviernos.

—Phalaropus fulicarius (Lin.). Es un raro visitante de invierno.

—Steganopus tricolor (Vieillot.). Visitante de invierno muy raro.

—Caiti. *Recurvirostra andina* (Philippi y Landbeck.). Se le suele encontrar en las lagunas de la cordillera.

—Pidén. *Rallus sanguinolentus landbecki* (Hellmayr.). Común en las vegas, sin ser abundante.

—Pidencito. *Creciscus jamaicensis salinasi* (Philippi). En las vegas.

—Tagüita. *Porphyriops melanops crassinotris* (J. E. Gray). En las vegas, donde no es muy común.

—Tagua. *Fulica leucopæra* (Vieillot.). Común en las vegas.

—Piuquén. *Chloëphaga melanoptero* (Eyton.). Muy común en las lagunas de la cordillera.

—Pato juarjual. *Anas cristata alticola* (Mènègoux.). No es común.

—Pato jergón grande. *Paecilnitta spinicauda* (Vieillot.). No es muy común.

—Pato colorado. *Querquedula cyanoptera cyanoptera* (Vieillot.). Muy común en algunas épocas.

—Erisimatura ferrugenea (Eyton.). No es común.

—Pato de la cordillera. *Merganetta armata armata* (Gould.). Es raro.

—Alcatraz. Pelicano. *Pelecanus thagus* (Molina). Muy abundante en la costa.

—Guanay. *Phalacrocorax bougainvillü* (Lesson.). En enormes bandadas en la costa, en algunas ocasiones.

—Pato lile. *Phalacrocorax gaimardi* (Less. y Garnot). No es muy común.

—Pato yeco. *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt). Muy común.

—Piquero. *Sula variegata* (Tschudi). Común y en inmensas bandadas, en algunas ocasiones.

—Golondrina de mar. *Sterna trudeaui* (Audubon.). No es muy común. Llega en invierno.

—Golondrina de mar. *Sterna hirundinacea* (Lesson.). Común en invierno. Los pescadores llaman "Chirro" a esta especie.

—Golondrina de mar. *Sterna elegans elegans* (Gambel.). Llega en invierno.

—Golondrina de mar. *Sterna fuscata luctuosa* (Philippi y Landbeck). Muy rara.

—Golondrina de mar. *Sterna paradisea* (Brünnich.). Muy rara vez llega en invierno.

—Monjita. *Larosterna inca* (Lesson y Garnot). Común en invierno.

—Rayador. *Rynchops nigra intermedia*. (Rendahl.). Común en todo tiempo.

—Gaviota común. *Larus dominicanus dominicanus* (Lichtenstein). Común todo el año.

—Garuma. San Andrés. *Larus modestus* (Tschudi.). Común.

—Quilla. *Larus serranus* (Tschudi.). Es escasa.

—Cáguil. *Larus maculipennis* (Lichtenstein). No es muy común.

—Gaviota. *Larus belcheri* (Vigors.). No es muy común.

—Gaviota. *Larus pipixcan* (Vagler.). No es común.

—Salteador. *Megalestris tkua chilensis* (Bonaparte). Común.

—Golondrinita de mar. *Oceanodroma hornbye* (Gray). No es muy común en la costa, pero sí afuera.

—Yegua. *Puffinus griseus* (Gmelin.). Suele ser común.

—Fardela oscura. *Puffinus creatopus* (Coues.). No es muy común.

—Fardela blanca. *Priocella glacialoides* (Smitt.). No es común.

—Fardela grande. *Ossifraga gigantea* (Gmelin.). No es rara.

—Tableo de damas. *Daption capensis* (Lin.). Suele ser común.

—Pato yunque. *Halodroma garnoti* (Less.). No es muy común.

—Pájaro carnero. *Diomedea exulans* (L.). Llega cerca de la costa, en algunas ocasiones.

—Pájaro carnero chico. *Diomedea cauta salvini* (Rothschild). No es muy común.

—Lagartón. *Diomedea melanophrys* (Temm.). Como el anterior.

—Blanquillo. *Colymbus occipitalis occipitalis* (Garnot). Visitante incidental.

—Pájaro niño. *Spheniscus humboldti* (Meyen.). Común y residente.
