

Un nueva cuclillo para Chile:  
*COCCYZUS MELACORYPHUS* VIELLOT

Rodulfo A. Philippi B.

BOLETIN

DEL

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

TOMO XXIX

N.º 9

SANTIAGO DE CHILE

1968



# Un nuevo cuclillo para Chile:

## COCCYZUS MELACORYPHUS VIELLOT

RODOLFO A. PHILIPPI B. (\*)

La familia de los cuclillos (*Cuculidae*) está ampliamente representada en el Viejo y Nuevo Mundo. Sólo en Sudamérica hay 7 géneros con 23 especies. Casi todas habitan la zona tropical, sólo algunas habitan la zona templada.

Hasta ahora conocíamos en Chile como único representante de esta familia al "mataballos", *Crotophaga s. sulcirostris* SWAINSON. Esta especie que se encuentra desde Texas en Estados Unidos hasta el extremo norte de Chile, en nuestro país, sólo es dable encontrarla y algo común, en los valles cultivados de Lluta y Azapa de los alrededores de Arica. LUIS E. PEÑA vio un ejemplar en el oasis de Peine en Julio de 1957. Dicha localidad está situada en la parte sudoeste del Salar de Atacama, provincia de Antofagasta. Por estar tan al sur y por ser observación de invierno, con seguridad que se trataba de un hallazgo casual.

Grata sorpresa hemos tenido al estudiar la colección que fue de don SERGIO BARRÓS VALENZUELA y encontrar en ella un bello ejemplar de cuclillo que había sido capturado por él el 8 de Mayo de 1960 en los jardines de un hotel en Chinchorro, barrio norte de la ciudad y puerto de Arica que está cerca de la frontera con el Perú.

Se trata de una hembra adulta con las siguientes medidas: Longitud 25 cm; Ala 121 mm; Cola 121 mm; Pico 25 mm.

Su estudio revela pertenecer a la especie denominada "cuclillo de pico negro" *Coccyzus melacoryphus* VIELLOT. Su descripción es la siguiente: por encima de un gris oliváceo con débil brillo metálico, toda la corona de color plomo; una raya negra fina bajo el ojo que se ensancha y cubre la región auricular. Lados del cuello de un ceniza claro (cinéreo). Toda la parte inferior de color ocre claro, blanquecino sucio en el abdomen. Alas del color del dorso y con el borde interno de las rémiges de un tono más claro; Subcaudales ocre oscuro. Rétrices medianas del color del dorso con extremo negruzco, las otras negras

---

\* Sección Ornitología, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.

con extremo terminado en blanco. Pico negro; patas oliva oscuro. El ave más joven parece que es de un ocre más intenso por debajo.

Este cuclillo hace su propio nido e incuba y cría en forma normal. No tiene costumbres de parasitismo como es el caso de otros representantes de la familia. En Sudamérica sólo lo hacen las especies del género *Tapera*, llamados "crespines" en Argentina. Del género *Dromococcyx* se sospecha que sea parasitario, pero no ha sido comprobado. *Crotophaga* esboza cierto grado de parasitismo pues varias hembras ponen sus huevos en un mismo nido. *Coccyzus* y los demás géneros anidan en forma normal.

El "cuclillo de pico negro" habita en bosques abiertos y acostumbra ocultarse en la vegetación tupida siendo a veces muy difícil de ver.

*Coccyzus melacoryphus* se encuentra en casi todo el continente sudamericano, llegando por el Sur en Argentina hasta La Rioja, la Pampa y Buenos Aires. También habita la isla de Trinidad, la isla Gorgona frente a la costa de Colombia y las islas Galápagos. En una ocasión se capturó un ejemplar sin duda extraviado en las islas Malvinas.

Agradecemos al joven ENRIQUE BARROS AUGIER su cooperación.

#### BIBLIOGRAFIA

TACZANOWSKI, W.

1886. Ornithologie du Pérou. 3:189.

COBY, C.B.

1919. Catalogue of the Birds of the Americas. Part II, Nº 2 : 338.

SICK, HELMUT

1953. Anotações sobre Cucos Brasileiros (Cuculidae, Aves) Rev. Brasil. Biol. 13(2) : 145-168. Rio de Janeiro, R. J.

OLROG, C.C.

1963. Lista y distribución de las aves argentinas: Opera Lilloana 9:167.

KOEPCKE, MARIA

1964. Las aves del Departamento de Lima : 66.

MEYER DE SCHAUENSEE

1966. The Species of Birds of South America with their Distribution Acad of Sci. of Philadelphia : 136.